

# Gebrauchsinformation

*Liebe Patientin, lieber Patient!*

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## **FORTAKEHL® D6** Flüssige Verdünnung zur Injektion

Wirkstoff: **Penicillium roquefortii D6** · Homöopathisches Arzneimittel

### **Zusammensetzung:**

1 Ampulle zu 1 ml enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

1 ml **Penicillium roquefortii D6** aquos. dil. (HAB 1, Vorschriften 5b, 11).

Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid.

**Darreichungsform und Inhalt:** 1, 10 bzw. 50 Ampullen flüssiger Verdünnung zur Injektion.



**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

**SANUM-KEHLBECK**  
GmbH & Co. KG

Arzneimittelherstellung  
Postfach 1355 · D-27316 Hoya

**Anwendungsgebiete:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

**Hinweise an den Anwender:** Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

### **Gegenanzeigen:**

*Wann dürfen Sie **FORTAKEHL® D6** nicht anwenden?*

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber Schimmelpilzen (**Penicillium roquefortii**).

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte **FORTAKEHL® D6** in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Keine.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt.

**Allgemeiner Hinweis:** Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

**Warnhinweise:** Keine.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:** Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt nichts anderes verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da dieses Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann!

*Wieviel und wie oft sollten Sie **FORTAKEHL® D6** anwenden?*

Soweit nicht anders verordnet, wird 2mal wöchentlich 1 ml entweder intracutan oder subcutan injiziert.

*Wie lange sollten Sie **FORTAKEHL® D6** anwenden?*

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

**Nebenwirkungen:** Keine bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweis:** Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:** Das Verfalldatum ist auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

**Stand der Gebrauchsinformation:** 01. 05. 2001.

---

**Hinweis:** Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!  
Bitte bewahren Sie das Arzneimittel vor Licht geschützt auf!

Zur weiteren Anwendung stehen **FORTAKEHL®** Tropfen, Kapseln, Tabletten und Zäpfchen zur Verfügung.